

LA GESTION DES GPE EN PÉDIATRIE LES BONNES PRATIQUES

Karine Le Meur & Karine Monnier

Infirmières Puéricultrices Coordinatrices Centre référence Ma.R.Di. (Centre De Référence Des Maladies Rares Digestives)

Pas de conflit d'intérêt

NOTRE ROLE

- Délivrer les informations à l'enfant et à l'entourage
- Faire du lien avec les équipes
- Coordonner le retour à domicile avec le prestataire
- Être un interlocuteur privilégié pour les parents lors du retour à domicile
- Ecouter, rassurer le patient et l'entourage

LA CONSULTATION AVANT LA POSE

Temps d'échanges avec l'enfant et la famille sur leurs connaissances par rapport à cette gastrostomie

- En amont, informations médicales données par le médecin gastro pédiatre ou oncopédiatre.
- Explication sur la technique de la pose, des plots , des complications éventuelles et de la gestion de la douleur post op.

LES PROTOCOLES REMIS

Programme ETP « Mieux vivre avec une nutrition entérale et des TAP »

La Gastrostomie Per Endoscopique GPE

Version Septembre 2024

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
Hôpital Sud – 16, boulevard de Bulgarie – BP 90347 – 35203 RENNES Cedex 02
<http://www.chu-rennes.fr>
Pneumologue de coordination : ☎ 02 23 06 73 34 poste 63705 Mail : informations@chu-rennes.fr
Secrétariat Pédiatrie Neurologie : ☎ 02 99 26 67 33 Mail : secretariatneuro@chu-rennes.fr



Informations médicales avant réalisation d'une GASTROSTOMIE PERCUTANEE ENDOSCOPIQUE type « Push »

CENTRE DE REFERENCE DES MALADIES DIGESTIVES RARES

COORDONNATEUR

Dr Laure BÉDOLIN-HENNO

GASTRO-ENTÉROLOGIE PÉDIATRIQUE

Dr Laure BÉDOLIN-HENNO

Dr Alain DABADIE

Dr Guillemette D'ARMENTIE

NUTRITION ADULTE

CENTRE LABELISÉ DE NUTRITION PARENTÉRALE À DOMICILE ADULTE

Pr Franck THIBAUT

CHIRURGIE DIGESTIVE PÉDIATRIQUE

Dr Alexis AËNAGLO

Dr Édouard MADONNANA

GÉNÉTIQUE

Pr Sylvie ODDOT

Dr Laurene FROISSIER

Dr Chloé OULEIN

Dr Philippe DENZEAU (Oncogénétique)

IMAGERIE

Dr Benjamin BRUNEAU

Dr Valérie CHARON

Dr Karim CHOULLATI

CADRE DE SANTÉ

Stéphanie LABBE

Madame, Monsieur,

L'état de santé de votre enfant empêche qu'il se nourrisse convenablement. Votre médecin vous propose la pose d'une gastrostomie percutanée par voie endoscopique. Celle-ci permet de mettre en place un bouton dans l'estomac qui ressort à travers la peau de l'abdomen entre les côtes et le nombril. Ce bouton va lui permettre de se nourrir (nutrition entérale) et/ou de s'hydrater et/ou d'administrer les médicaments.

Selon l'avis de votre médecin, après la pose du bouton, votre enfant pourra continuer à manger et à boire par la bouche.

Afin que vous soyez clairement informé(e) du déroulement de cet acte médical, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information. Le médecin est à votre disposition pour vous exposer en complément toute autre précision que vous souhaiteriez.

Quels sont les avantages de la gastrostomie percutanée endoscopique ?

La gastrostomie percutanée endoscopique est un geste simple et rapide dont la réalisation présente peu de risques. Il existe peu de contre-indications et votre médecin a pris soin de les rechercher avant de proposer cette technique.

Le bouton de gastrostomie peut facilement être dissimulé sous les vêtements et est donc invisible pour les autres.

Le geste est réalisé sous anesthésie générale après consultation avec un anesthésiste.

Comment se préparer pour la gastrostomie percutanée endoscopique ?

Avant la pose de la sonde, une consultation avec un médecin anesthésiste est réalisée. Il pourra répondre à toutes vos questions concernant l'anesthésie.

Un prélèvement sanguin sera effectué pour vérifier la coagulation, la numération formule sanguine.


Le jour de la pose, votre enfant devra être à jeun strict (sans boire, ni manger) six heures avant l'intervention. Il sera effectué une douche avec un savon antiseptique.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
Hôpital Sud – 16, boulevard de Bulgarie – BP 90347 – 35203 RENNES Cedex 02
<http://www.chu-rennes.fr>
Pneumologue de coordination : ☎ 02 23 06 73 34 Mail : informations@chu-rennes.fr
Secrétariat du centre MaRDi : ☎ 02 99 26 71 77 Fax : 02 99 26 58 43 Mail : secretariat@chu-rennes.fr


LA PRESENTATION D'UN BOUTON DE GASTROSTOMIE



EXPLICATION DES PLOTS D'INSERTION



LE MATERIEL A DOMICILE



SUPPORTS PÉDAGOGIQUES DE NUTRICIA



LIVRETS DE JEUX 5-8 ans

<https://www.enteraledomicile.fr/3d-flip-book/cahier-dactivites-8-12-ans/>

LIVRETS DE JEUX 8-12 ans



<https://www.nutricia.fr/wp-content/uploads/2023/10/livre-jules.pdf>



SUPPORTS PEDAGOGIQUES NUTRICIA ET LIENS

TRUCS ET ASTUCES DE PARENTS A PARENTS

GUIDE DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT à destination des parents

https://www.enteraledomicile.fr/wp-content/uploads/2021/10/TA_pour-la-vie-de-famille.pdf



LES QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

- Combien de temps dure l'intervention ?
- Est-ce que j'aurai mal après l'intervention ?
- Est-ce que les plots font mal ?
- Est-ce que je pourrai me doucher, prendre un bain ?
- Est-ce qu'on pourra m'enlever le bouton si je n'en ai plus besoin?
- Est-ce que l'orifice se referme naturellement quand on enlève le bouton?
- Quel type d'alimentation sera administré et quelle quantité?

LES MESSAGES IMPORTANTS

- Les soins d'hygiène se font au sérum physiologique les premiers jours et ensuite avec eau et savon quotidiennement
- Pas de compresse autour du bouton
- Tourner le bouton d'1/4 de tour tous les jours
- Le ballonnet est gonflé avec 5 ml eau minérale
- La Fungizone® rend le ballonnet poreux (penser à faire changer le bouton au bout de 4 mois)
- Le bouton n'empêche pas de se baigner ou de faire des activités sportives (éviter sport de combat)

LES MESSAGES IMPORTANTS

- Matériel fourni par un prestataire de santé
- Nécessité d'un bouton de rechange à domicile , fourni par un prestataire
- Si le bouton est parti, l'orifice se resserre en 4 à 6 h
- Bouton changé tous les 4 à 6 mois en consultation (1ere fois par un médecin)
- Si bouton arraché avant 3 mois, faire une opacification après son changement
- Si bouton bouché ,administrer de l'eau tiède (Eviter les boissons gazeuses)

NOUVEAUTES

- ❑ Nouvelle recommandation antibioprophylaxie : antibiotiques en per-opératoire
- ❑ Nouveaux plots

LES ASSOCIATIONS

www.lavieparunfil.com



www.homeperf.com/documentation

GUIDE PRATIQUE NUTRITION ARTIFICIELLE LVL HOME PERF

www.zipsnap.fr

SITE PATCH STOMIE



MERCI DE VOTRE ATTENTION

